

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO SULL'INTERVENTO DI

Liposcultura ambulatoriale


Prima di illustrare i rischi vs benefici dell'intervento proposto è importante che lei sappia che: lo scopo della chirurgia plastica estetica è quello correggere difetti o dismorfie di varia natura. Chi si aspetta dalla chirurgia plastica estetica trasformazioni miracolose è destinato a inevitabili delusioni. La chirurgia plastica estetica comporta atti medici e chirurgici e, poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non lo è nemmeno la chirurgia plastica estetica. Si deduce che non può essere pronosticata in modo preciso la percentuale di miglioramento del difetto da correggere, l'entità e la durata del risultato e la qualità delle cicatrici residue. E' necessario sottolineare che alcuni fattori condizionano il risultato finale: fra questi, in primo luogo ma non solo, i processi di guarigione e di cicatrizzazione che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal chirurgo, né dal paziente, le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico, e le influenze ormonali ed ereditarie. Tali elementi insieme ad altri fattori, influenzano la variabilità del risultato finale. Ogni atto chirurgico così come la chirurgia plastica estetica, produce inevitabilmente sequele, di differente entità a seconda del tipo d'intervento e del caso specifico, che devono essere valutate prima di sottoporsi all'intervento: fra queste inevitabili sono le cicatrici. Il più delle volte, peraltro, a seguito di tali interventi, le ferite chirurgiche, situate lungo pieghe o solchi naturali, o comunque occultate per quanto possibile in sedi difficilmente accessibili allo sguardo, appaiono poco visibili, ma in realtà sono permanenti ed indelebili. Talora, a causa di una particolare predisposizione individuale, di sopravvenute complicazioni postoperatorie o di una scarsa attenzione del paziente ai suggerimenti impartiti, le cicatrici possono risultare di qualità scadente. E' bene quindi ricordare che il chirurgo può garantire solo delle ferite chirurgiche suturate con grande precisione, non delle cicatrici invisibili. Come in qualsiasi tipo di chirurgia, anche in chirurgia plastica estetica, sono possibili errori e complicanze. I primi, imprevedibili e indesiderabili e le seconde, prevedibili e a volte inevitabili, rientrano fra i rischi che ogni paziente deve considerare prima dell'intervento. Di conseguenza, per i suddetti motivi, pur rispettando le regole della chirurgia plastica, l'intervento potrebbe non determinare, seppure in casi particolari, il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato che, di conseguenza, non può essere garantito o assicurato.

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preintervento con il medico, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi all'intervento di LIPOSCULTURA AMBULATORIALE. La preghiamo pertanto di leggere attentamente il documento, di discutere con il medico la spiegazione di ogni termine che non fosse chiaro e quindi di firmarlo come conferma di avere ben compreso le informazioni ricevute.

INFORMAZIONI GENERALI

Gli accumuli localizzati di grasso corporeo, resistenti alla dieta e alla ginnastica, possono

essere eliminati definitivamente mediante la LIPOSCULTURA, tecnica di rimodellamento corporeo a cielo coperto. La LIPOSCULTURA è una tecnica destinata alle adiposità localizzate e non al sovrappeso: non può essere valutata perciò in termini di peso in quanto non ne comporta la diminuzione. La LIPOSCULTURA può essere effettuata su qualsiasi area, ma le zone dove viene praticata più frequentemente sono i fianchi, le cosce, le ginocchia, l'addome, la regione sottomentoniera. La quantità di grasso asportabile è limitata e determinata di volta in volta dal medico, in base alle caratteristiche del singolo paziente. L'intervento è ripetibile. All'intervento residuano cicatrici cutanee di minima estensione (pochi millimetri), collocate in corrispondenza di solchi cutanei naturali e



perciò destinate a diventare poco visibili. Eventuali smagliature o irregolarità sottocutanee non saranno corrette. Il tipo di anestesia, i tempi di degenza, la frequenza e il tipo di medicazioni, l'epoca della rimozione dei punti, dipendono dal singolo caso clinico e dalla tecnica impiegata. Il risultato, pur apprezzabile fin dai primi tempi, si evidenzia in non meno di due mesi ed è destinato a migliorare ulteriormente.

L'intervento chirurgico generalmente ha una durata di circa 1 ora e può essere eseguito in anestesia locale con o senza sedazione. I pazienti non hanno particolare fastidio nel post-operatorio. Generalmente 48 ore dopo l'intervento il paziente può riprendere l'attività lavorativa e può tornare alla completa normalità in circa 7 giorni.

PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO

E' necessario:

- eseguire un preliminare esame del sangue (emocromo, glicemia, creatininemia, azotemia, INR, PTT, AST, ALT, Na, K, Ca) ed in alcuni casi un ECG (elettrocardiogramma) per escludere malattie che possano controindicare l'intervento di liposcultura;
- informare il medico di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, ecc.):
- segnalare patologie pregresse o in atto (cardiopatie, ipertensione arteriosa, diabete, mal.

metaboliche, disturbi della coagulazione, trombosi, asma, mal. polmonari, epatiti, malattie infettive, mal. renali, mal. autoimmuni,...):

- segnalare allergie a farmaci
- organizzare, per il periodo post-intervento, la presenza di un accompagnatore/trice;
- procurarsi una guaina elastica (1 taglia inferiore alla propria);
- praticare un accurato bagno di pulizia completo; rimuovere lo smalto dalle unghie;

Non sono richieste particolari precauzioni nei giorni che precedono l'intervento ad eccezione dell'astensione dal fumo, alcolici e dall'assunzione di anticoagulanti/antiaggreganti. Il giorno dell'intervento presentarsi a digiuno se l'intervento è fissato per la mattina o fare una colazione leggera se l'intervento è al pomeriggio). Indossare indumenti comodi.

L'INTERVENTO

Dopo aver eseguito il disegno pre-operatorio si effettuano alcuni accessi cutanei (tagli di 3-4 mm circa di lunghezza). Si procede poi con l'infiltrazione del tessuto da trattare mediante soluzione contenente anestetico locale e adrenalina. Successivamente si effettua l'aspirazione dell'adipe in eccesso mediante cannule a pressione negativa. A risultato ottenuto si procede alla chiusura degli accessi con steril strip o con un punto di sutura e ad una adeguata medicazione compressiva.



PERIODO POST-OPERATORIO

Il paziente è dimesso poche ore dopo l'intervento. E' raccomandato eseguire la terapia assegnata, non assumere alcolici o farmaci contenenti acido acetilsalicilico e di non fumare. Per qualsiasi indicazione fare riferimento alla lettera di dimissione consegnata.

Nel periodo post-intervento si formeranno ecchimosi e sarà avvertito nelle zone trattate moderato dolore, che si attenuerà in un periodo variabile di pochi giorni. Il gonfiore sarà presente per circa un mese.

RISCHI DELL'INTERVENTO

Ogni intervento chirurgico comporta dei rischi che, seppur minimi, sono importanti da comprendere. La scelta individuale di sottoporsi ad un intervento chirurgico si basa sul confronto tra il rischio reale ed il beneficio potenziale. Sebbene la maggior parte dei pazienti non sviluppi le complicazioni qui di seguito elencate, è necessario conoscerle ed eventualmente discuterne con il chirurgo.

- in caso di adiposità cospicue o di asimmetrie costituzionali potranno essere opportuni piccoli *interventi correttivi secondari*;

- in taluni casi, specie in pazienti non giovani o con pelle anelastica, all'intervento potranno residuare *irregolarità, cellulite e rilassamenti* della superficie cutanea;

- la *sensibilità* della pelle potrà talora rimanere alterata in piccole zone per un breve periodo, raramente in modo permanente;

- la qualità delle *cicatrici* è indipendente dalla tecnica ma legata alla reattività individuale, potrebbe esitare anche una leggera iperpigmentazione, nonché cicatrici ipo/ipertrofiche.

- *Sanguinamento* - *Sieroma*

- *Infezione* - *Asimmetria*

- *Guarigione lenta* - *Embolia*

- *Discromie* - *Ustioni*

- *Irregolarità nel profilo.*

- *Complicanze Anestesiologiche.*

- *Danneggiamento delle strutture profonde.*

- *Effetti a lungo termine.* Alterazioni del risultato verificarsi dopo un certo periodo e sono riconducibili all'invecchiamento, perdita o

aumento del peso, esposizione al sole o altre circostanze non legate all'intervento stesso.

- *Risultato insoddisfacente.* Potreste essere delusi dal risultato dell'intervento. Raramente è necessario effettuare un ritocco per migliorare i risultati.

- *Necessità di un intervento supplementare.*

Esistono molte variabili oltre al rischio e alle complicazioni chirurgiche che possono influenzare il risultato duraturo. Anche se i rischi e le complicazioni si verificano raramente, i rischi citati sono quelli che sono maggiormente associati. Altre complicanze e rischi possono verificarsi, ma sono più rari. Se dovessero emergere delle complicazioni, può essere necessario un intervento supplementare o altri trattamenti. La medicina e della chirurgia non sono scienze esatte. Anche se sono prevedibili buoni risultati, non c'è garanzia assoluta o implicita che tali risultati possano essere ottenuti.

CONSENSO INFORMATO

Autorizzo Dr. Amore ed i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell'intervento stesso che in periodo post-operatorio. Accetto di sottopormi alle terapie mediche e fisiche che mi verranno prescritte nel periodo postoperatorio, essendo informato che, in caso contrario, potrei compromettere l'esito dell'intervento. Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente programmato a priori l'esatto risultato, così come la qualità delle cicatrici residue e l'eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo. Acconsento ad essere fotografata prima, durante e dopo l'intervento, a scopo di documentazione clinica, che il chirurgo si impegna ad usare solo in contesto scientifico e con assoluta garanzia di anonimato. Inoltre sono stato informato su tutte le possibili complicazioni chirurgiche ed anestesiologiche,

compresa la presenza di eventuali cicatrici vistose o patologiche. Sono consapevole del fatto che, nel corso dell'intervento chirurgico e successivamente, possano rendersi necessarie, a giudizio del medico, procedure addizionali o diverse da quelle che mi sono state preliminarmente illustrate. Accetto di tornare al controllo postoperatorio come e negli intervalli richiesti dal chirurgo. Sono consapevole che la mancata presenza ai controlli postoperatori può

essere causa di complicazioni anche severe. Confermo di aver ricevuto informazioni esaurienti e di aver ottenuto risposta a tutte le mie domande. Pertanto acconsento quindi ad essere sottoposto all'intervento di liposcultura. Autorizzo il Dr. Amore ed i suoi assistenti a sottopormi alle cure mediche e chirurgiche necessarie dopo l'intervento. Dichiaro inoltre di seguire tutte le indicazioni post operatorie prescritte dal Dr. Amore.

Data ____/____/____

Nome _____ nato/a a _____ il _____

Residente _____ tel. _____

Firma del paziente

Dr. Amore